




Windpark Mückendorf

Rastvogel-Kartierung

Nachgewiesene Rastvogel-Arten

|      |                  |                                   |
|------|------------------|-----------------------------------|
| Blg  | Blassgans        | ( <i>Anser albifrons</i> )        |
| Ez   | Erlenzelsig      | ( <i>Spinus spinus</i> )          |
| Feg  | Feldgans unbest. | ( <i>Anser spec.</i> )            |
| Ful  | Flussuferläufer  | ( <i>Actitis hypoleucos</i> )     |
| Gra  | Gaugans          | ( <i>Anser anser</i> )            |
| Grr  | Graureiher       | ( <i>Ardea cinerea</i> )          |
| H6   | Höckerschwan     | ( <i>Cygnus olor</i> )            |
| Ht   | Haubentaucher    | ( <i>Podiceps cristatus</i> )     |
| Kch  | Kranich          | ( <i>Grus grus</i> )              |
| Ki   | Kiebitz          | ( <i>Vanellus vanellus</i> )      |
| Ko   | Kormoran         | ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )    |
| Kra  | Kolkrabe         | ( <i>Corvus corax</i> )           |
| Kw   | Kornweihe        | ( <i>Circus cyaneus</i> )         |
| Mb   | Mäusebussard     | ( <i>Buteo buteo</i> )            |
| Mer  | Merlin           | ( <i>Falco columbarius</i> )      |
| Rei  | Reiherente       | ( <i>Aythya fuligula</i> )        |
| Rhg  | Rothalsgans      | ( <i>Branta ruficollis</i> )      |
| Rm   | Rotmilan         | ( <i>Milvus milvus</i> )          |
| Row  | Rohrweihe        | ( <i>Circus aeruginosus</i> )     |
| Rt   | Ringeltaube      | ( <i>Columba palumbus</i> )       |
| Rw   | Raubwürger       | ( <i>Lanius excubitor</i> )       |
| S    | Star             | ( <i>Sturnus vulgaris</i> )       |
| SagT | Tundrasaatgans   | ( <i>Anser fabalis rossicus</i> ) |
| Sim  | Silbermöwe       | ( <i>Larus argentatus</i> )       |
| Sir  | Silberreiher     | ( <i>Egretta alba</i> )           |
| Sp   | Sperber          | ( <i>Accipiter nisus</i> )        |
| Sto  | Stockente        | ( <i>Anas platyrhynchos</i> )     |
| Tf   | Turmfalke        | ( <i>Falco tinnunculus</i> )      |
| Was  | Waldschnepfe     | ( <i>Scolopax rusticola</i> )     |
| Wd   | Wacholderdrossel | ( <i>Turdus pilaris</i> )         |

Verhalten

- am Boden sitzend / ruhend / abfliegend / landend
- Nahrung suchend
- überfliegend

Bei den Zahlen handelt es sich um die Anzahl der Individuen (>1).

Sonstige Informationen

- Beobachtungspunkte
- Kartierraum 1.000 m
- Vorhabensfläche


Windpark Mückendorf

Rastvogel-Kartierung

Karte 4a

im Auftrag von  
FROELICH & SPORBECK  
UMWELTPLANUNG UND BERATUNG

Ökoplan  
Institut für ökologische Planungshilfe  
Hochkirchstr. 8  
D-10829 Berlin  
Fon: 030-4621765  
Fax: 030-46085420  
oekoplan-grf@t-online.de



November 2024



1:10.000